


Anleitung: Fymkina® 45 mg/90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze zur einmaligen Anwendung.



Vorbereitung:

Fertigspritze aus dem Kühlschrank nehmen und ca. **30 Minuten bei Raumtemperatur** liegen lassen. **Spritze überprüfen:** nach Verfallsdatum, ob sie unbeschädigt ist und sie keine ungewöhnlichen Veränderungen in Aussehen oder Beschaffenheit aufweist.*



Injektionsstelle:

Geeignet sind **Oberschenkel und Bauch** mit 5 cm Abstand vom Nabel. Stelle immer wechseln und nur gesunde Hautbereiche wählen.




Injektion:

1. **Hände** gründlich **waschen** und die Hautstelle **desinfizieren**
2. **Schutzkappe** von der **Nadel entfernen** und diese nicht berühren
3. **Hautfalte** mit zwei Fingern bilden und die Nadel vollständig einführen
4. Kolben **gleichmäßig** durchdrücken, Nadel **behutsam herausziehen**, Haut loslassen und gebrauchte **Spritze entsorgen**



Nach der Injektion:

Tupfer auf **Injektionsstelle** drücken und ggf. Pflaster aufkleben. **Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen** ärztlich abklären lassen.



Weitere Informationen zu Fymkina® sowie ein **Anwendungsvideo** erhalten Sie unter www.ratiopharm.de/anwendung oder über den QR-Code.

*Detaillierte Angaben zur Erscheinung der Injektionslösung finden Sie unter Punkt 6 in der Gebrauchsinformation.