

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

*Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten*

## 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

Jede Filmtablette enthält 500 mg Azithromycin (als Azithromycin 2 H<sub>2</sub>O).

Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

## 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Blassblaue, oblonge, bikonvexe Filmtablette mit der Prägung „A1 500“ und einseitiger Bruchkerbe

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

## 4. KLINISCHE ANGABEN

### 4.1 Anwendungsgebiete

*Azithromycin-ratiopharm* wird angewendet zur Behandlung der folgenden Infektionen bei Erwachsenen und Jugendlichen mit einem Körpergewicht von mindestens 45 kg (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1):

- Akute Streptokokken-Tonsillopharyngitis
- Akute bakterielle Sinusitis
- Akute bakterielle Otitis media
- Ambulant erworbene Pneumonie (CAP)
- Akute bakterielle Haut- und Weichteilinfektionen (ABSSSI)
- Urethritis und Zervizitis, verursacht durch *Chlamydia trachomatis*
- Urethritis und Zervizitis, verursacht durch *Neisseria gonorrhoeae* in Kombination mit einem anderen geeigneten Antibiotikum (z. B. Ceftriaxon)

*Azithromycin-ratiopharm* wird angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit akuter Exazerbation einer chronischen Bronchitis.

Die offiziellen Leitlinien zur angemessenen Anwendung von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu beachten.

### 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

#### Dosierung

*Erwachsene und Jugendliche mit einem Körpergewicht von mindestens 45 kg*  
Azithromycin sollte als tägliche Einzeldosis angewendet werden.

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

Tabelle 1: Dosierungsempfehlungen für Erwachsene und Jugendliche mit einem Körpergewicht von mindestens 45 kg

| Anwendungsgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dosierungsschema für Azithromycin                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute Streptokokken-Tonsillopharyngitis<br><br>Akute bakterielle Sinusitis<br><br>Akute bakterielle Otitis medi<br><br>Akute Exazerbation der chronischen Bronchitis*<br><br>Ambulant erworbene Pneumonie#<br><br>Akute bakterielle Haut- und Weichteilinfektionen                                                                                                                                                                                                                                             | 500 mg/Tag für 3 Tage<br><br>oder<br><br>500 mg an Tag 1, gefolgt von 250 mg/Tag an den Tagen 2–5 |
| Urethritis und Zervizitis verursacht durch <i>Chlamydia trachomatis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 mg als Einzeldosis                                                                          |
| Urethritis und Zervizitis verursacht durch <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , in Kombination mit einem anderen geeigneten Antibiotikum (z. B. Ceftriaxon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 mg oder 2 000 mg* als Einzeldosis                                                           |
| * Nur für die Behandlung von Erwachsenen<br># Falls klinisch indiziert, kann bei Erwachsenen auf die intravenöse Anwendung eine orale Behandlung folgen, um ein Behandlungsschema von insgesamt 7 bis 10 Tagen abzuschließen (Einzelheiten siehe Fachinformation zu intravenösen Darreichungsformen von Azithromycin).<br><br>Die in den aktualisierten Behandlungsleitlinien für jedes Anwendungsgebiet empfohlenen Behandlungsschemata, Dosierungen und die jeweilige Dauer der Behandlung sind zu beachten. |                                                                                                   |

## Versäumte Dosis

Sind seit der versäumten Dosis weniger als 12 Stunden vergangen, sollte der Patient angewiesen werden, die Dosis so bald wie möglich einzunehmen und anschließend die nächste Dosis zum regulär vorgesehenen Zeitpunkt einzunehmen. Sind seit dem üblichen Einnahmezeitpunkt mehr als 12 Stunden vergangen, sollte der Patient angewiesen werden, bis zur nächsten vorgesehenen Dosis zu warten.

## Besondere Patientengruppen

### Nierenfunktionsstörung

Bei Patienten mit einer GFR  $\geq 10$  ml/min ist keine Dosisanpassung erforderlich. Bei Patienten mit einer GFR  $< 10$  ml/min sollte Azithromycin mit Vorsicht angewendet werden (siehe Abschnitt 5.2).

### Leberfunktionsstörung

Bei Patienten mit leichter (Child-Pugh-Klasse A) oder mittelschwerer (Child-Pugh-Klasse B) Leberfunktionsstörung ist keine Dosisanpassung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2). Es liegen keine Daten zu Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse C) vor. Daher sollte Azithromycin bei diesen Patienten mit Vorsicht angewendet werden (siehe Abschnitt 4.4).

### Ältere Patienten

Bei älteren Patienten ist keine Dosisanpassung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2). Da ältere Patienten anfälliger für Arrhythmien sind, ist wegen des Risikos für die Entwicklung von Herzrhythmusstörungen und Torsade-de-Pointes-Tachykardie besondere Vorsicht geboten (siehe Abschnitt 4.4).

### Kinder und Jugendliche

Es gibt keinen relevanten Nutzen von *Azithromycin-ratiopharm* zur Behandlung von akuten Exazerbationen der chronischen Bronchitis bei pädiatrischen Patienten.

Es sind weitere Darreichungsformen verfügbar, die möglicherweise besser für die Behandlung von Patienten geeignet sind, die keine Tabletten schlucken können, und pädiatrischen Patienten mit einem Körpergewicht unter 45 kg.

# Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## Art der Anwendung

### Zum Einnehmen.

Die Tabletten können mit oder ohne eine Mahlzeit eingenommen werden. Die Einnahme unmittelbar vor einer Mahlzeit kann die gastrointestinale Verträglichkeit verbessern.

Die Tabletten können in zwei gleiche Hälften geteilt werden, um die Dosis anzupassen. Die ganze oder eine halbe Tablette sollte als tägliche Einzeldosis entsprechend den Dosierungsempfehlungen eingenommen werden.

## 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, Erythromycin, andere Makrolid- oder Ketolid-Antibiotika oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

## 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

### Möglichkeit der Resistenzbildung

Aufgrund der lang anhaltenden und nach Ende der Behandlung abnehmenden Azithromycin-Konzentrationen im Plasma und in den Geweben könnte Azithromycin die Entwicklung von Resistenzen begünstigen (siehe Abschnitt 5.2). Eine Behandlung mit Azithromycin sollte nur dann nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung unter Berücksichtigung der lokalen Resistenzprävalenz eingeleitet werden, wenn bevorzugte Therapieschemata nicht angezeigt sind.

### Schwere Haut- und Überempfindlichkeitsreaktionen

In Zusammenhang mit der Anwendung von Azithromycin wurden seltene, schwerwiegende allergische Reaktionen, einschließlich Angioödem und Anaphylaxie (selten mit Todesfolge), sowie schwere Hautreaktionen (SCARs), einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), toxischer epidermaler Nekrolyse (TEN), der Arzneimittelwirkung mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS) und des akut generalisierenden pustulösen Exanthems (AGEP), die lebensbedrohlich oder tödlich sein können, berichtet (siehe Abschnitt 4.8). Zum Zeitpunkt der Verschreibung sollten Patienten auf Anzeichen und Symptome hingewiesen und engmaschig im Hinblick auf Hautreaktionen überwacht werden. Einige dieser Reaktionen unter Azithromycin führten zu rezidivierenden Symptomen und erforderten eine längerfristige Beobachtung und Behandlung. Bei Auftreten einer allergischen Reaktion sollte Azithromycin abgesetzt und eine geeignete Behandlung eingeleitet werden. Ärzte sollten sich bewusst sein, dass es bei Absetzen der symptomatischen Behandlung zu einem Wiederauftreten der allergischen Symptomatik kommen kann.

### QT-Intervall-Verlängerung

In Zusammenhang mit der Anwendung anderer Makrolid-Antibiotika einschließlich Azithromycin wurden Verlängerungen der kardialen Repolarisation und des QT-Intervalls beobachtet, welche ein Risiko der Entwicklung kardialer Arrhythmien und von Torsade-de-Pointes-Tachykardien bergen (siehe Abschnitt 4.8). Da die folgenden Situationen zu einem erhöhten Risiko für ventrikuläre Arrhythmien (einschließlich Torsade-de-Pointes-Tachykardien) mit möglichem Herzstillstand führen können, sollte Azithromycin bei Patienten mit anhaltenden proarrhythmischen Zuständen (insbesondere Frauen und älteren Patienten), mit Vorsicht angewendet werden, wie z.B. bei:

- Patienten mit angeborener oder dokumentierter QT-Verlängerung
- Patienten, die derzeit andere Wirkstoffe anwenden, die bekanntermaßen das QT-Intervall verlängern (siehe Abschnitt 4.5)
- Patienten mit Elektrolytstörungen, insbesondere bei Vorliegen einer Hypokaliämie und Hypomagnesiämie
- Patienten mit klinisch relevanter Bradykardie, kardialen Arrhythmien oder schwerer Herzinsuffizienz
- älteren Patienten, da diese anfälliger für arzneimittelbedingte Effekte auf das QT-Intervall sein können

### Lebertoxizität

Da Azithromycin hauptsächlich über die Leber eliminiert wird, sollte Azithromycin bei Patienten mit schweren Lebererkrankungen mit Vorsicht angewendet werden. In Zusammenhang mit der Anwendung von Azithromycin wurde über Fälle von fulminanter Hepatitis berichtet, die potenziell zu lebensbedrohlichem Leberversagen führte. Unter der Behandlung mit Azithromycin wurden auch Fälle von Hepatitis, cholestatischem Ikterus, hepatischer Nekrose und Leberversagen berichtet, teilweise mit tödlichem Ausgang (siehe Abschnitt 4.8). Einige Patienten hatten möglicherweise bereits eine vorbestehende Lebererkrankung oder nahmen andere hepatotoxische Arzneimittel ein. Patienten sollten angewiesen werden, die Anwendung von Azithromycin abzubrechen und ihren Arzt zu kontaktieren, wenn Anzeichen und Symptome einer Leberfunktionsstörung auftreten, z. B. eine sich rasch entwickelnde Asthenie in Verbindung mit Gelbsucht, dunklem Urin, Blutungsneigung oder hepatischer Enzephalopathie. In solchen Fällen sollten umgehend Leberfunktionstests/Untersuchungen der Leber durchgeführt werden.

# Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## Clostridioides difficile-assoziierte Diarrhö (CDAD) und pseudomembranöse Kolitis

In Zusammenhang mit der Anwendung von Azithromycin wurde über CDAD und pseudomembranöse Kolitis berichtet, wobei der Schweregrad von leichtem Durchfall bis hin zu einer Kolitis mit letalem Ausgang reichen kann (siehe Abschnitt 4.8). CDAD und pseudomembranöse Kolitis müssen bei Patienten in Erwägung gezogen werden, bei denen während oder nach der Anwendung von Azithromycin eine Diarrhö auftritt. Es sollten ein Abbruch der Behandlung mit Azithromycin und die Einleitung unterstützender Maßnahmen zusammen mit einer spezifischen Behandlung gegen *C. difficile* in Betracht gezogen werden. Peristaltik-hemmende Arzneimittel sollten nicht gegeben werden.

## Sexuell übertragbare Infektionen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass *Neisseria gonorrhoeae* gegen Makrolid-Antibiotika, einschließlich des Azalids Azithromycin, resistent ist (siehe Abschnitt 5.1). Daher wird Azithromycin nicht für die Behandlung einer unkomplizierten Gonorrhoe und entzündlicher Beckenerkrankungen empfohlen, es sei denn, die Empfindlichkeit des Erregers gegenüber Azithromycin wurde durch Laborergebnisse bestätigt. Wird die Erkrankung nicht oder nur suboptimal behandelt, können im späteren Verlauf Komplikationen auftreten, wie z. B. Unfruchtbarkeit und ektopische Schwangerschaften.

Wenn darüber hinaus eine Einzeldosis Azithromycin für die Behandlung einer Urethritis oder Zervizitis verursacht durch *N. gonorrhoeae* oder *C. trachomatis* in Betracht gezogen wird (siehe Abschnitt 4.2), sollte eine begleitende urogenitale Infektion durch *Mycoplasma genitalium* ausgeschlossen werden, da bei diesem Erreger ein hohes Risiko für das Auftreten einer Resistenz besteht.

Darüber hinaus sollte eine durch *Treponema pallidum* verursachte Begleitinfektion ausgeschlossen werden, da andernfalls die Symptome einer sich entwickelnden Syphilis möglicherweise maskiert werden und dadurch die Diagnosestellung verzögert werden könnte.

Bei allen Patienten mit sexuell übertragbaren urogenitalen Infektionen sollten eine geeignete antibakterielle Therapie eingeleitet und mikrobiologische Nachuntersuchungen durchgeführt werden.

## Myasthenia gravis

In Zusammenhang mit der Anwendung von Azithromycin wurde über Exazerbationen der Symptome einer Myasthenia gravis oder das erstmalige Auftreten eines Myasthenie-Syndroms berichtet (siehe Abschnitt 4.8).

## Nicht-empfindliche Erreger

Die Anwendung von Azithromycin kann zu einem übermäßigen Wachstum nicht-empfindlicher Erreger führen. Das Auftreten einer Superinfektion kann eine Unterbrechung der Behandlung oder die Einleitung anderer adäquater Maßnahmen erforderlich machen.

## Ergotalkaloid-Derivate

Bei Patienten, die Ergotalkaloid-Derivate erhielten, wurde ein Ergotismus durch die gleichzeitige Anwendung bestimmter Makrolid-Antibiotika ausgelöst. Es liegen keine Daten zu einer möglichen Wechselwirkung zwischen Ergotalkaloiden und Azithromycin vor. Aufgrund der theoretischen Möglichkeit eines Ergotismus dürfen Azithromycin und Ergotalkaloid-Derivate nicht gleichzeitig verabreicht werden.

## Sonstiger Bestandteil

### Natrium

Azithromycin-ratiopharm enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Filmtablette, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

## 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Obwohl Azithromycin ein schwacher CYP450-Inhibitor ist und keine signifikanten Wechselwirkungen mit CYP450-Substraten hat, kann eine CYP3A4-Hemmung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher ist bei einer gleichzeitigen Verabreichung mit CYP3A4-Substraten mit geringer therapeutischer Breite Vorsicht geboten.

Azithromycin ist ein Inhibitor des Transporters P-Glykoprotein (P-gp). Die gleichzeitige Anwendung von Azithromycin mit P-gp-Substraten, wie z. B. Digoxin und Colchicin, kann die Exposition gegenüber solchen Arzneimitteln erhöhen. Bei Arzneimitteln mit einer geringen therapeutischen Breite werden Vorsicht, eine klinische Überwachung und/oder Arzneimittelspiegelbestimmung sowie, bei Bedarf, eine Anpassung der Dosis empfohlen. In diesem Zusammenhang sollte die relativ lange Halbwertszeit von Azithromycin berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 5.2).

## Substanzen, die bekanntermaßen das QT-Intervall verlängern

Azithromycin sollte mit Vorsicht bei Patienten angewendet werden, die Arzneimittel erhalten, die bekanntermaßen das QT-Intervall verlängern (siehe Abschnitt 4.4), wie z. B. Antiarrhythmika der Klasse IA (z. B. Chinidin und Procainamid) und der Klasse III (z. B. Dofetilid, Amiodaron und Sotalol), Antipsychotika (z. B. Pimozid), Antidepressiva (z. B. Citalopram), Fluorchinolone (z. B. Moxifloxacin und Levofloxacin), Cisaprid, Chloroquin und Hydroxychloroquin.

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

Informationen zu Arzneimittelwechselwirkungen für Azithromycin mit potenziell gleichzeitig angewendeten Arzneimitteln sind in der Tabelle und im Text unten zusammengefasst. Die beschriebenen Arzneimittelwechselwirkungen basieren auf klinischen Studien zu Arzneimittelwechselwirkungen mit Azithromycin oder sind, wo angegeben, mögliche Arzneimittelwechselwirkungen mit Azithromycin.

Tabelle 2: Klinisch relevante Arzneimittelwechselwirkungen zwischen Azithromycin und anderen Arzneimitteln

| Arzneimittel<br>(therapeutischer<br>Bereich)                                                                                                       | Wechselwirkung<br>Auswirkung auf Exposition                                                                                                                                                                                        | Mechanismus                                                                                                                               | Empfehlung für die gleichzeitige<br>Anwendung                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atorvastatin (HMG-CoA-Reduktase-Hemmer)<br><br>Azithromycin 500 mg einmal täglich oral über 3 Tage.<br><br>Atorvastatin 10 mg einmal täglich oral. | Azithromycin: ND<br><br>Atorvastatin:<br>↔ AUC<br>↔ C <sub>max</sub>                                                                                                                                                               | Atorvastatin ist ein CYP3A4- und P-gp-Substrat.                                                                                           | Es ist Vorsicht geboten, da nach der Markteinführung Fälle von Rhabdomyolyse bei Patienten berichtet wurden, die Azithromycin gleichzeitig mit Statinen erhielten.                                             |
| Ciclosporin (Immunsuppressivum)<br><br>Azithromycin 500 mg einmal täglich oral über 3 Tage.<br><br>Ciclosporin 10 mg/kg als orale Einzeldosis.     | Azithromycin: ND<br><br>Ciclosporin:<br>↔ AUC<br>↑ C <sub>max</sub> 24 %                                                                                                                                                           | Ciclosporin ist ein CYP3A4- und P-gp-Substrat mit einer geringen therapeutischen Breite und/oder konkurriert um die biliäre Ausscheidung. | Während und nach der Behandlung mit Azithromycin sollte eine klinische Überwachung sowie gegebenenfalls eine Arzneimittelspiegelbestimmung erfolgen. Bei Bedarf sollte die Ciclosporin-Dosis angepasst werden. |
| Colchicin (Gicht)                                                                                                                                  | Azithromycin: ND<br><br>Colchicin:<br>↑ 57 % AUC <sub>0-t</sub><br>↑ 22 % C <sub>max</sub>                                                                                                                                         | Colchicin ist ein P-gp-Substrat mit einer geringen therapeutischen Breite.                                                                | Während und nach der Behandlung mit Azithromycin ist eine klinische Überwachung erforderlich.                                                                                                                  |
| Dabigatran (orales Antikoagulans)                                                                                                                  | ND<br><br>Erwartet:<br>↑ Dabigatran                                                                                                                                                                                                | Dabigatran ist ein P-gp-Substrat mit einer geringen therapeutischen Breite.                                                               | Es ist Vorsicht geboten, da Daten nach der Markteinführung bei Patienten, die Azithromycin gleichzeitig mit Dabigatran erhielten, auf ein erhöhtes Risiko für Blutungen hindeuten.                             |
| Digoxin (Herzglykoside)                                                                                                                            | ND<br><br>Erwartet:<br>↑ Digoxin                                                                                                                                                                                                   | Digoxin ist ein P-gp-Substrat mit einer geringen therapeutischen Breite.                                                                  | Während und nach der Behandlung mit Azithromycin ist eine klinische Überwachung sowie möglicherweise eine Überwachung des Digoxin-Spiegels erforderlich.                                                       |
| Warfarin (orales Antikoagulans)<br><br>Azithromycin 500 mg einmal täglich oral für 1 Tag und anschließend 250 mg einmal täglich oral für 4 Tage.   | Azithromycin: ND<br><br>Warfarin: ND<br>In einer klinischen Studie zu Arzneimittelwechselwirkungen wurde keine Veränderung der Prothrombinzeit beobachtet. Es liegen jedoch Berichte nach der Markteinführung über eine verstärkte | Nicht bekannt.                                                                                                                            | Während und nach der Behandlung mit Azithromycin sollten häufigere Kontrollen der Prothrombinzeit in Betracht gezogen werden.                                                                                  |

# Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Warfarin 15 mg als orale Einzeldosis.                                                                                                                                  | Antikoagulation nach gleichzeitiger Anwendung von Azithromycin und oralen Antikoagulanzen vom Cumarin-Typ vor. |  |  |
| Hinweis: Statistisch signifikante Veränderungen um mehr als 10 % sind mit „↑“ oder „↓“ angegeben, keine Veränderung mit „↔“, nicht bestimmt mit „ND“ (not determined). |                                                                                                                |  |  |

In klinischen Studien zur Bewertung potenzieller Arzneimittelwechselwirkungen von Azithromycin mit oralen Antazida (Aluminium- und Magnesiumhydroxid), Carbamazepin, Cetirizin, Cimetidin, Efavirenz, Fluconazol, Methylprednisolon, Midazolam, Rifabutin, Sildenafil, Theophyllin, Triazolam, Trimethoprim/Sulfamethoxazol und Zidovudin wurden keine klinisch relevanten Veränderungen der Exposition gegenüber Azithromycin oder den gleichzeitig angewendeten Arzneimitteln festgestellt.

## Kinder und Jugendliche

Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen wurden nur bei Erwachsenen durchgeführt.

## 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

### Schwangerschaft

Es wurden tierexperimentelle Reproduktionsstudien mit für das Muttertier bis zu mäßig toxischen Dosiskonzentrationen durchgeführt. In diesen Studien wurden keine teratogenen Effekte beobachtet. Es liegen jedoch keine geeigneten und gut kontrollierten Studien bei Schwangeren vor.

Es liegen weitreichende Erfahrungen aus Beobachtungsstudien zur Exposition gegenüber Azithromycin während der Schwangerschaft vor (über 7 000 Azithromycin-Expositionen in der Schwangerschaft). Die meisten dieser Studien deuten nicht auf ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen beim Fötus hin, wie z. B. schwere angeborene oder kardiovaskuläre Fehlbildungen.

Epidemiologische Evidenz bezüglich des Risikos für Fehlgeburten nach Azithromycin-Exposition in der Frühschwangerschaft sind nicht eindeutig. Tierexperimentelle Studien weisen nicht auf eine Reproduktionstoxizität hin (siehe Abschnitt 5.3).

Azithromycin sollte während der Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn es klinisch erforderlich ist.

### Stillzeit

Azithromycin wird in erheblichem Maße in die Muttermilch ausgeschieden. Es wurden keine schwerwiegenden nachteiligen Wirkungen von Azithromycin auf gestillte Säuglinge beobachtet. Nebenwirkungen wie Durchfall, Pilzinfektion der Schleimhäute sowie Überempfindlichkeit können bei gestillten Neugeborenen/Säuglingen auch bei subtherapeutischen Dosen auftreten. Es muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist oder ob auf die Azithromycin-Therapie verzichtet werden soll bzw. die Behandlung zu unterbrechen ist. Dabei soll sowohl der Nutzen des Stillens für das Kind als auch der Therapienutzen für die Frau berücksichtigt werden.

### Fertilität

In Fertilitätsstudien an Ratten wurden nach Gabe von Azithromycin verminderte Trächtigkeitsraten festgestellt. Die Bedeutung dieses Ergebnisses für den Menschen ist nicht bekannt.

## 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Azithromycin-ratiopharm hat einen mäßigen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Bei einigen Patienten wurden unter der Einnahme von Azithromycin Schwindelgefühl, Benommenheit und Krämpfe berichtet, und einige Patienten berichteten über Seh- und/oder Hörstörungen. Dies sollte bei der Beurteilung eines Patienten bezüglich seiner Verkehrstüchtigkeit und seiner Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 4.8).

## 4.8 Nebenwirkungen

### Zusammenfassung des Sicherheitsprofils

Die unter der Behandlung am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen umfassen Diarrhö, Kopfschmerzen, Erbrechen, Abdominalschmerzen, Übelkeit und abnorme Laborwerte. Weitere wichtige Nebenwirkungen umfassen anaphylaktische Reaktionen, Torsade-de-Pointes-Tachykardien, Arrhythmien einschließlich ventrikulärer Tachykardie, pseudomembranöse Kolitis und Leberversagen (siehe Abschnitt 4.4). In Zusammenhang mit der Anwendung von Azithromycin wurden schwere Hautreaktionen (SCARs), einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), toxischer epidermaler Nekrolyse (TEN), der Arzneimittelwirkung mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS) und des akut generalisierenden pustulösen Exanthems (AGEP), berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## Tabellarische Zusammenfassung der Nebenwirkungen

Nebenwirkungen, welche in klinischen Studien und im Rahmen der Überwachung nach der Markteinführung identifiziert wurden, sind im Folgenden nach Systemorganklasse und Häufigkeit aufgeführt.

Die Häufigkeiten der Nebenwirkungen sind wie folgt definiert: sehr häufig ( $\geq 1/10$ ), häufig ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), gelegentlich ( $\geq 1/1\,000$ ,  $< 1/100$ ), selten ( $\geq 1/10\,000$ ,  $< 1/1\,000$ ), sehr selten ( $< 1/10\,000$ ), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Innerhalb jeder Häufigkeitskategorie sind die Nebenwirkungen nach Schweregrad absteigend geordnet.

Tabelle 3: Tabellarische Zusammenfassung der Nebenwirkungen

| Systemorgan-klasse                                  | Sehr häufig | Häufig                                                                                                                            | Gelegentlich                                                                                                                                                  | Selten       | Nicht bekannt                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infektionen und parasitäre Erkrankungen</b>      |             |                                                                                                                                   | Candida-Infektion<br>Pneumonie<br>Pilzinfektion<br>Bakterielle Infektion<br>Vaginalinfektion<br>Pharyngitis<br>Gastroenteritis<br>Rhinitis<br>Orale Candidose |              |                                                                                                                                                        |
| <b>Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems</b> |             | Lymphozytenzahl erniedrigt<br>Eosinophilenzahl erhöht<br>Basophilenzahl erhöht<br>Monozytenzahl erhöht<br>Neutrophilenzahl erhöht | Leukopenie<br>Neutropenie<br>Eosinophilie<br>Thrombozytenzahl erhöht<br>Hämatokrit erniedrigt                                                                 |              | Thrombozytopenie<br>Hämolytische Anämie                                                                                                                |
| <b>Erkrankungen des Immunsystems</b>                |             |                                                                                                                                   | Angioödem<br>Überempfindlichkeit (siehe Abschnitt 4.4)                                                                                                        |              | Anaphylaktische Reaktion                                                                                                                               |
| <b>Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen</b>        |             |                                                                                                                                   | Appetit vermindert                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                        |
| <b>Psychiatrische Erkrankungen</b>                  |             |                                                                                                                                   | Nervosität<br>Schlaflosigkeit                                                                                                                                 | Agitiertheit | Angst<br>Delirium<br>Halluzination<br>Aggression                                                                                                       |
| <b>Erkrankungen des Nervensystems</b>               |             | Kopfschmerzen                                                                                                                     | Schwindelgefühl<br>Dysgeusie<br>Parästhesie<br>Somnolenz                                                                                                      |              | Myasthenia gravis (siehe Abschnitt 4.4)<br>Krampfanfall<br>Anosmie<br>Ageusie<br>Hypästhesie<br>Psychomotorische Hyperaktivität<br>Parosmie<br>Synkope |
| <b>Augenerkrankungen</b>                            |             |                                                                                                                                   | Sehverschlechterung                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                        |
|                                                     |             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                        |

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

|                                                            |                                   |                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths                   |                                   |                                           | Ohrenerkrankung<br>Vertigo                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Taubheit<br>Hypakusis<br>Tinnitus                                                                                                                                                           |
| Herzerkrankungen                                           |                                   |                                           | Palpitationen                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Torsade-de-Pointes-Tachykardie (siehe Abschnitt 4.4)<br>Arrhythmie einschließlich ventrikulärer Tachykardie (siehe Abschnitt 4.4)<br>Elektrokardiogramm QT verlängert (siehe Abschnitt 4.4) |
| Gefäßerkrankungen                                          |                                   |                                           | Hitzewallung                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | Hypotonie                                                                                                                                                                                   |
| Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums |                                   |                                           | Dyspnoe<br>Atemerkrankung<br>Epistaxis                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts                    | Diarrhö<br>Abdominale Beschwerden | Erbrechen<br>Abdominalschmerz<br>Übelkeit | Gastritis<br>Obstipation<br>Dyspepsie<br>Dysphagie<br>Bauch aufgetrieben<br>Mundtrockenheit<br>Mundulzeration<br>Hypersalivation<br>Aufstoßen<br>Flatulenz |                                                                                                                                                               | Pankreatitis<br>Pseudomembranöse Kolitis (siehe Abschnitt 4.4)<br>Zungenverfärbung                                                                                                          |
| Leber- und Gallenerkrankungen                              |                                   |                                           | Hepatitis<br>Aspartatamino-transferase erhöht<br>Alaninamino-transferase erhöht<br>Bilirubin im Blut erhöht<br>Alkalische Phosphatase im Blut erhöht       | Leberfunktion anomal<br>Gelbsucht cholestatisch                                                                                                               | Leberversagen (siehe Abschnitt 4.4)<br>Hepatitis fulminant verlaufend<br>Lebernekrose                                                                                                       |
| Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes             |                                   |                                           | Ausschlag<br>Pruritus<br>Urtikaria<br>Dermatitis<br>Trockene Haut<br>Hyperhidrosis                                                                         | Akut generalisierendes pustulöses Exanthem (AGEP)<br>Arzneimittelwirkung mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS)<br>Lichtempfindlichkeitsreaktion | Toxische epidermale Nekrolyse<br>Stevens-Johnson-Syndrom<br>Erythema multiforme                                                                                                             |
| Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen   |                                   |                                           | Osteoarthritis<br>Myalgie<br>Rückenschmerzen<br>Nackenschmerzen                                                                                            |                                                                                                                                                               | Arthralgie                                                                                                                                                                                  |



# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

|                                                                    |  |                               |                                                                                                                                  |  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| Erkrankungen der Nieren und Harnwege                               |  |                               | Dysurie<br>Nierenschmerz<br>Blutharnstoff erhöht<br>Kreatinin im Blut erhöht                                                     |  | Akute Nierenfunktions-einschränkung<br>Tubulointerstitielle Nephritis |
| Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse              |  |                               | Zwischenblutung<br>Hodenerkrankung                                                                                               |  |                                                                       |
| Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort       |  |                               | Ödem<br>Asthenie<br>Unwohlsein<br>Ermüdung<br>Gesichtsödem<br>Brustkorbschmerz<br>Fieber<br>Schmerz<br>Peripheres Ödem           |  |                                                                       |
| Untersuchungen                                                     |  | Bikarbonat im Blut erniedrigt | Kalium im Blut anomal<br>Chlorid im Blut erhöht<br>Glukose im Blut erhöht<br>Bikarbonat im Blut erhöht<br>Natrium im Blut anomal |  |                                                                       |
| Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen |  |                               | Komplikation nach einem Eingriff                                                                                                 |  |                                                                       |

## Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung anzuzeigen über:

### Deutschland

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: <http://www.bfarm.de>

### Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy  
ou Division de la pharmacie et des médicaments  
de la Direction de la santé  
Site internet: [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

## 4.9 Überdosierung

### Symptome

Die bei Dosierungen oberhalb der jeweils empfohlenen Dosis beobachteten Nebenwirkungen waren denen nach normalen Dosen ähnlich (siehe Abschnitt 4.8). Die typischen Symptome einer Überdosierung mit Azithromycin sind gastrointestinale Symptome, d. h. Erbrechen, Diarrhö, Abdominalschmerz und Übelkeit.

# Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## Behandlung

Im Falle einer Überdosierung sind eine allgemeine symptomatische Behandlung, eine Unterstützung der Vitalfunktionen und, falls erforderlich, die Verabreichung von Aktivkohle oder eine Magenspülung indiziert.

Zur Wirkung einer Dialyse auf die Elimination von Azithromycin liegen keine Daten vor. Aufgrund des Eliminationsmechanismus von Azithromycin ist es jedoch unwahrscheinlich, dass eine Dialyse zu einer signifikanten Ausscheidung des Wirkstoffs führt.

## 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

### 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antibiotika zur systemischen Anwendung, Makrolide

ATC-Code: J01FA10

#### Wirkmechanismus

Der Wirkmechanismus von Azithromycin beruht auf der Hemmung der bakteriellen Proteinsynthese durch Bindung an die 50S-Untereinheit des Ribosoms und Hemmung der Translokation der Peptide.

#### Beziehung zwischen Pharmakokinetik und Pharmakodynamik

Die Wirksamkeit hängt im Wesentlichen vom Quotienten aus AUC (Area Under the Curve, Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve) und der minimalen Hemmkonzentration (MHK) des Erregers ab.

#### Resistenzmechanismen

Eine Resistenz gegenüber Azithromycin kann auf folgenden Mechanismen beruhen:

- Efflux: Eine Resistenz kann durch Erhöhung der Anzahl von Effluxpumpen in der Zytoplasmamembran hervorgerufen werden, von der ausschließlich 14- und 15-gliedrige Makrolide betroffen sind (sog. M-Phänotyp).
- Veränderung der Zielstruktur: Durch Methylierung der 23S-rRNS ist die Affinität zu den ribosomalen Bindungsstellen erniedrigt, wodurch es zur Resistenz gegenüber Makroliden (M), Lincosamiden (L) und Streptograminen der Gruppe B ( $S_B$ ) kommt (sog.  $MLS_B$ -Phänotyp). Zu einer Resistenz führende Methylasen werden durch *erm(erythromycin ribosome methylation)*-Gene kodiert. Die Affinität zu den ribosomalen Bindungsstellen wird auch durch Mutationen in der 23S-rRNS-Zielstruktur oder durch Mutationen in den ribosomalen Proteinen der großen Untereinheit verringert.
- Die enzymatische Inaktivierung von Makroliden ist nur von untergeordneter klinischer Bedeutung.

Beim M-Phänotyp liegt eine vollständige Kreuzresistenz von Azithromycin mit Clarithromycin, Erythromycin bzw. Roxithromycin vor. Beim  $MLS_B$ -Phänotyp besteht zusätzlich eine Kreuzresistenz mit Clindamycin und Streptogramin B. Mit dem 16-gliedrigen Makrolid Spiramycin besteht eine partielle Kreuzresistenz.

Aufgrund der geringen Permeabilität der äußeren Membran sind die meisten Gram-negativen Spezies von Natur aus resistent gegen Makrolide.

#### Grenzwerte der Empfindlichkeitstestung

Die Interpretationskriterien für die Empfindlichkeitstestung anhand der Bestimmung der MHK (minimalen Hemmkonzentration) wurden vom European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) für Azithromycin festgelegt und sind hier aufgeführt: [https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints\\_en.xlsx](https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx)

#### Prävalenz der erworbenen Resistenz

Die Prävalenz der erworbenen Resistenz einzelner Spezies kann örtlich und im Verlauf der Zeit variieren. Deshalb sind – insbesondere für die Behandlung schwerer Infektionen – lokale Informationen über die Resistenzsituation erstrebenswert. Falls aufgrund der lokalen Resistenzsituation der Nutzen des Wirkstoffs zumindest bei einigen Infektionsarten infrage gestellt ist, sollte bei Bedarf eine Beratung durch Experten angestrebt werden. Insbesondere bei schwerwiegenden Infektionen oder bei Therapieversagen ist eine mikrobiologische Diagnose mit dem Nachweis des Erregers und dessen Empfindlichkeit gegenüber Azithromycin anzustreben.

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

Die folgenden Angaben entsprechen den europäisch harmonisierten Daten mit Stand vom 08.09.2025. Die Daten zur aktuellen Resistenzsituation für Azithromycin in Deutschland finden Sie als weitere Angabe nach Abschnitt 11. am Ende dieser Fachinformation.

Tabelle 4: Prävalenz der erworbenen Resistenz

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üblicherweise empfindliche Spezies</b>                                                          |
| <b>Aerobe Gram-positive Mikroorganismen</b>                                                        |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>                                                                      |
| <b>Aerobe Gram-negative Mikroorganismen</b>                                                        |
| <i>Haemophilus influenzae</i>                                                                      |
| <i>Legionella pneumophila</i> <sup>°</sup>                                                         |
| <i>Moraxella catarrhalis</i>                                                                       |
| <b>Anaerobe Mikroorganismen</b>                                                                    |
| <i>Peptostreptococcus</i> spp.                                                                     |
| <b>Andere Mikroorganismen</b>                                                                      |
| <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> (früher <i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i> ) |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> <sup>°</sup>                                                          |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> <sup>°</sup>                                                       |
| <i>Chlamydophila psittaci</i>                                                                      |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <sup>°</sup>                                                          |
| <b>Spezies, bei denen erworbene Resistenzen ein Problem darstellen können</b>                      |
| <b>Aerobe Gram-positive Mikroorganismen</b>                                                        |
| <i>Staphylococcus aureus</i> <sup>+</sup>                                                          |
| <i>Streptococcus agalactiae</i>                                                                    |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> <sup>++</sup>                                                      |
| Viridans-Streptokokken                                                                             |
| <b>Aerobe Gram-negative Mikroorganismen</b>                                                        |
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i>                                                                       |
| <b>Anaerobe Mikroorganismen</b>                                                                    |
| <i>Prevotella</i> spp.                                                                             |
| <b>Von Natur aus resistente Organismen</b>                                                         |
| <b>Aerobe Gram-negative Mikroorganismen</b>                                                        |
| <i>Escherichia coli</i>                                                                            |
| <i>Klebsiella</i> spp.                                                                             |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                                      |

<sup>°</sup> Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen keine aktuellen Daten vor. In der Primärliteratur, der wissenschaftlichen Standardliteratur und Therapieempfehlungen wird von einer Empfindlichkeit ausgegangen.

<sup>+</sup> In mindestens einer Region liegen die Resistenzraten für Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus* bei über 50 %.

<sup>++</sup> Bei Penicillin-empfindlichen *Streptococcus pneumoniae*-Stämmen ist die Wahrscheinlichkeit einer Empfindlichkeit gegenüber Azithromycin höher als bei Penicillin-resistenten *Streptococcus pneumoniae*-Stämmen.

# Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

### Resorption

Die maximalen Konzentrationen von Azithromycin im Serum ( $C_{\max}$ ) nach der Gabe von 500 mg Suspension zum Einnehmen (40 mg/ml), 1 000 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, 500 mg (2 x 250 mg) Tabletten bzw. 1 000 mg (4 x 250 mg) Kapseln bei gesunden Probanden unter nüchternen Bedingungen betrugen 0,29; 0,75; 0,34 bzw. 1,07 mg/l. Nach oraler Anwendung von Azithromycin werden die Plasmaspitzenkonzentrationen ( $T_{\max}$ ) nach 2 bis 3 Stunden erreicht. Nach Gabe von 500 mg Suspension zum Einnehmen bzw. 1 000 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen in einem Beutel unter nüchternen Bedingungen betrug die mittlere absolute Bioverfügbarkeit bei gesunden Probanden 37 % bzw. 44 %.

Die Wirkung von Nahrung auf die relative orale Bioverfügbarkeit von Azithromycin hängt von der Darreichungsform ab. Nach Gabe von 500 mg Suspension zum Einnehmen (40 mg/ml), 1 000 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen und 500 mg Azithromycin-Tabletten (2 x 250 mg) wurde nach einer fettreichen Mahlzeit eine ähnliche Exposition wie unter nüchternen Bedingungen erreicht. Nach Gabe einer Einzeldosis mit 500 mg (2 x 250 mg) Kapseln zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit waren die mittleren  $C_{\max}$ - bzw.  $AUC_{0-24}$ -Werte im Vergleich zu nüchternen Bedingungen um 52 % bzw. 43 % niedriger.

Tabelle 5 zeigt die mittleren (SD) pharmakokinetischen Parameter bei erwachsenen gesunden Probanden nach Standarddosierungsschemata mit Tabletten und Kapseln.

Tabelle 5:  $AUC_{0-24}$  und  $C_{\max}$  von Azithromycin für das 3-tägige und 5-tägige Dosierungsschema am Tag der letzten Gabe an gesunde Probanden

| Dosierungsschema, Formulierung                                             | $AUC_{0-24}$ ( $\mu\text{g}\cdot\text{h/ml}$ ) | $C_{\max}$ ( $\mu\text{g/ml}$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3-tägiges Schema<br>(500 mg täglich), Tablette                             | 1,88 (0,96)                                    | 0,42 (0,21)                     |
| 5-tägiges Schema<br>(500 mg an Tag 1, 250 mg an Tag 2 bis Tag 5), Tablette | 0,80 (0,42)                                    | 0,18 (0,10)                     |
| 5-tägiges Schema<br>(500 mg an Tag 1, 250 mg an Tag 2 bis Tag 5), Kapsel   | 2,1 (0,6)                                      | 0,24 (0,08)                     |

### Verteilung

Azithromycin wird schnell und weitreichend aus dem Plasma in das extravaskuläre Kompartiment verteilt, einschließlich Geweben wie Mandeln, Lunge und gynäkologische Gewebe, sowie in das intrazelluläre Kompartiment, insbesondere in polymorphkernige Leukozyten, Makrophagen und Monozyten. Pharmakokinetische Studien haben gezeigt, dass in bestimmten Geweben deutlich höhere Azithromycin-Konzentrationen erreicht werden (bis zum 50-Fachen der im Plasma beobachteten maximalen Konzentration). Dies deutet auf eine umfangreiche Bindung an diese Gewebe mit einem Verteilungsvolumen im *Steady State* im Bereich von 23 bis 31 l/kg hin. Die Umverteilungsphase vom intrazellulären in das extrazelluläre Kompartiment und ins Plasma kann nach Behandlungsende zu länger anhaltenden niedrigen Konzentrationen führen.

Die Plasmaproteinbindung von Azithromycin, vorwiegend an saures Alpha-1-Glykoprotein, ist niedrig, und nimmt mit steigender Konzentration des Antibiotikums ab: 50 %, 23 % bzw. 7 % Proteinbindung bei Konzentrationen von 0,05; 0,1 bzw. 1 mg/l.

### Biotransformation

Azithromycin wird in der Leber nur in geringem Maße metabolisiert. Der wichtigste Weg der Biotransformation ist die N-Demethylierung des Aminozuckers Desosamin. Andere Stoffwechselwege sind u. a. O-Demethylierung, Hydrolyse der Cladinose (Spaltung des Cladinose-Konjugats) und Hydroxylierung des Desosamin-Zuckers und des Makrolidrings.

Es gibt keine Hinweise für eine klinisch relevante Induktion oder Inhibition von Cytochrom P450 3A4 in der Leber durch die Bildung eines Cytochrom-Metabolit-Komplexes. Auch ein durch diesen Stoffwechselweg selbst induzierter Metabolismus von Azithromycin wurde nicht nachgewiesen.

# Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## Elimination

Azithromycin wird hauptsächlich unverändert über (aktive) biliäre Exkretion ausgeschieden sowie in Form von Metaboliten, die keine antibakterielle Wirkung aufweisen. Die Ausscheidung über den Urin stellt mit weniger als 6 % einer oral eingenommenen Dosis und ungefähr 20 % des in den systemischen Kreislauf gelangenden Wirkstoffs einen untergeordneten Ausscheidungsweg dar. Mehr als 50 % der Ausscheidung über den Stuhl und 12 % der Ausscheidung über den Urin erfolgen in unveränderter Form des Wirkstoffs.

Nach Gabe einer Einzeldosis von 500 mg Azithromycin wurde eine Plasma-Clearance von 630 ml/min mit einer terminalen Eliminationshalbwertszeit von etwa 68 Stunden geschätzt. Die renale Clearance liegt im Allgemeinen im Bereich zwischen 100 und 189 ml/min und ist somit deutlich niedriger als die Plasma-Clearance, was aufgrund der relativ geringen Beteiligung der Nieren an der Elimination zu erwarten ist.

## Linearität/Nicht-Linearität

Nach oraler Gabe einer Darreichungsform mit sofortiger Freisetzung lag die Dosisproportionalität für die  $AUC_{0-24}$  und  $C_{max}$  im Bereich von 250 mg bis 1 000 mg.

## Besondere Patientengruppen

### Nierenfunktionsstörung

Die Pharmakokinetik von Azithromycin wurde bei 43 Erwachsenen (im Alter von 21 bis 85 Jahren) nach oraler Gabe einer Einzeldosis mit 1,0 g Azithromycin (4 x 250 mg Kapseln) an Probanden mit einer GFR > 80 ml/min (n = 12), einer GFR zwischen 10 und 80 ml/min (n = 12) und mit einer GFR < 10 ml/min (n = 19) untersucht.

Bei Probanden mit einer GFR zwischen 10 und 80 ml/min wurde die Pharmakokinetik von Azithromycin nicht beeinflusst (Anstieg der mittleren  $C_{max}$ - bzw.  $AUC_{0-120}$ -Werte um 5,1 % bzw. 4,2 %, im Vergleich zu Probanden mit einer GFR > 80 ml/min). Bei Probanden mit einer GFR < 10 ml/min stiegen die mittleren  $C_{max}$ - bzw.  $AUC_{0-120}$ -Werte um 61 % bzw. 35 % im Vergleich zu Probanden mit einer GFR > 80 ml/min an.

Es liegen keine Daten zu dialysepflichtigen Patienten vor. Aufgrund des Eliminationsmechanismus von Azithromycin ist es jedoch unwahrscheinlich, dass eine Dialyse zu einer signifikanten Ausscheidung des Wirkstoffs führt.

### Leberfunktionsstörung

Die Pharmakokinetik von Azithromycin wurde bei 22 Erwachsenen nach oraler Gabe einer Einzeldosis mit 500 mg Azithromycin (2 x 250 mg Kapseln) an Probanden mit normaler Leberfunktion (n = 6), mit leichter Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse A, n = 10) und mit mittelschwerer Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse B, n = 6) untersucht. Im Vergleich zu Probanden mit normaler Leberfunktion war die Pharmakokinetik von Azithromycin bei Probanden mit Child-Pugh-Klasse A bzw. B 3 % bzw. 19 % niedriger bezüglich der  $AUC_{0-inf}$  und 34 % bzw. 72 % höher bezüglich der  $C_{max}$ .

### Ältere Patienten

Bei älteren Probanden (> 65 Jahre), die 500 mg Azithromycin (2 x 250 mg Kapseln) an Tag 1, gefolgt von 250 mg an Tag 2 bis 5 in nüchternem Zustand erhielten, betrug die  $AUC_{0-24}$  an den Tagen 1 und 5 jeweils 3,0 bzw. 2,7  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{ml}$ . Im Vergleich zu jüngeren Probanden (< 40 Jahre) wurde an Tag 5 ein Anstieg der  $AUC_{0-24}$  um 29 %, der  $C_{max}$  um 8 % und der  $T_{max}$  um 37,5 % beobachtet. Da diese Differenzen nicht als klinisch signifikant betrachtet werden, ist bei älteren Teilnehmern mit normaler Nieren- und Leberfunktion keine Dosisanpassung erforderlich.

## Kinder und Jugendliche

Die Pharmakokinetik von Azithromycin Suspension zum Einnehmen wurde bei 14 Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren mit Pharyngitis und bei 7 Kindern im Alter von 1–5 Jahren mit Otitis media untersucht. In den beiden Studien wurde Azithromycin Suspension zum Einnehmen in einer Dosierung von 10 mg/kg an Tag 1, gefolgt von 5 mg/kg an den Tagen 2 bis 5, verabreicht. Nach 5 Behandlungstagen lagen die mittleren  $AUC_{0-24}$ -Werte bei 3,1  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{ml}$  bzw. 1,8  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{ml}$ . Der mittlere  $C_{max}$ -Wert betrug 0,38  $\mu\text{g}/\text{ml}$  und der entsprechende mittlere  $T_{max}$ -Wert 2,4 Stunden bei Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren sowie jeweils 0,22  $\mu\text{g}/\text{ml}$  und 1,9 Stunden bei Kindern im Alter von 1 bis 5 Jahren. Die mittleren  $C_{max}$ - und  $AUC_{0-24}$ -Werte sind bei Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren 1,7-mal höher als bei Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahren.

Die PK eines 3-tägigen Behandlungszyklus mit Azithromycin Suspension zum Einnehmen in einer Dosis von 10 mg/kg täglich wurde auch bei 16 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 10 Jahren mit bakteriellen Infektionen untersucht. Die mittlere  $AUC_{0-24}$  bei 7 Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren betrug 2,90  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{ml}$ , während der Wert bei 8 Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren bei 2,08  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{ml}$  lag. Ein niedriger  $AUC_{0-24}$ -Wert von 0,74  $\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{ml}$  wurde bei einem einzelnen Kind der Gruppe im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren gemessen.

Die Pharmakokinetik einer Einzeldosis Azithromycin nach der Gabe von Dosen mit 30 mg/kg an pädiatrische Patienten wurde nicht untersucht.

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien zur Sicherheitspharmakologie, Toxizität bei wiederholter Gabe und Genotoxizität lassen die präklinischen Daten keine Nebenwirkungen erkennen, die für den Menschen eindeutig relevant sind und nicht bereits in anderen Abschnitten der Fachinformation berücksichtigt wurden.

Phospholipidose (intrazelluläre Phospholipidansammlung) wurde jedoch in verschiedenen Geweben bei Mäusen, Ratten und Hunden nach mehreren Azithromycin-Dosen festgestellt. In ähnlichem Ausmaß wurde Phospholipidose im Gewebe von neugeborenen Ratten und Hunden beobachtet. Es wurde gezeigt, dass die Wirkung nach Absetzen der Azithromycin-Therapie reversibel war. Die Bedeutung dieser Befunde für den Menschen ist im Allgemeinen nicht bekannt.

In tierexperimentellen Studien zur Untersuchung einer möglichen Embryotoxizität bei für das Muttertier bis zu mäßig toxischen Dosen (dem 2- bis 3-Fachen der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Dosis von 500 mg basierend auf der Körperoberfläche) wurden bei Mäusen und Ratten keine teratogenen Effekte beobachtet. Es wurde gezeigt, dass Azithromycin die Plazentaschranke passiert. Bei Ratten führten Azithromycin-Dosen von 100 und 200 mg/kg Körpergewicht/Tag (das 2- bis 3-Fache der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Dosis von 500 mg basierend auf der Körperoberfläche) zu einer leichten Verzögerung der fetalen Ossifikation und der mütterlichen Körpergewichtszunahme. In Peri- und Postnatalstudien wurden bei Ratten nach Azithromycin-Dosen von 200 mg/kg/Tag (das 3-Fache der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Dosis von 500 mg basierend auf der Körperoberfläche) leichte Verzögerungen beobachtet.

## 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

### 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

#### Tablettenkern:

Calciumhydrogenphosphat  
Hypromellose  
Maisstärke  
Vorverkleisterte Stärke (Mais)  
Mikrokristalline Cellulose  
Natriumdodecylsulfat  
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

#### Filmüberzug:

Hypromellose  
Polysorbat 80  
Talkum  
Indigocarmin-Aluminiumsalz (E 132)  
Titandioxid (E 171)

### 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

### 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

### 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/Al-Blisterpackung in einer Faltschachtel

Packungsgröße: 3 Filmtabletten

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm**

## 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

## 7. INHABER DER ZULASSUNG

ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

## 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

62572.00.00

## 9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 30. August 2005

Datum der letzten Verlängerung der Zulassung: 3. April 2009

## 10. STAND DER INFORMATION

Dezember 2025

## 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

Die aktuellen Resistenzdaten für Deutschland (Stand: Mai 2025) finden Sie in folgender Tabelle:

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Üblicherweise empfindliche Spezies          |
| <i>Aerobe Gram-positive Mikroorganismen</i> |
| <i>Mycobacterium avium</i> °                |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ~             |
| <i>Aerobe Gram-negative Mikroorganismen</i> |
|                                             |

# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

ratiopharm

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Legionella pneumophila</i> °                                                                 |
| <i>Moraxella catarrhalis</i>                                                                    |
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i>                                                                    |
| <b>Andere Mikroorganismen</b>                                                                   |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> °                                                                  |
| <i>Chlamydia pneumoniae</i> °                                                                   |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> °                                                                  |
| <b>Spezies, bei denen erworbene Resistenzen ein Problem bei der Anwendung darstellen können</b> |
| <b>Aerobe Gram-positive Mikroorganismen</b>                                                     |
| <i>Staphylococcus aureus</i> (Methicillin-sensibel)                                             |
| <i>Staphylococcus aureus</i> (Methicillin-resistent) <sup>+</sup>                               |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i>                                                               |
| <i>Staphylococcus haemolyticus</i>                                                              |
| <i>Staphylococcus hominis</i>                                                                   |
| <i>Streptococcus agalactiae</i>                                                                 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> <sup>Ω</sup>                                                    |
| <b>Von Natur aus resistente Spezies</b>                                                         |
| <b>Aerobe Gram-negative Mikroorganismen</b>                                                     |
| <i>Escherichia coli</i>                                                                         |
|                                                                                                 |



# Azithromycin-ratiopharm<sup>®</sup> 500 mg Filmtabletten

**ratiopharm***Klebsiella* spp.*Pseudomonas aeruginosa*

<sup>o</sup> Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen keine aktuellen Daten vor. In der Primärliteratur, Standardwerken und Therapieempfehlungen wird von einer Empfindlichkeit ausgegangen.

<sup>+</sup> In mindestens einer Region liegt die Resistenzrate bei über 50 %.

<sup>Ω</sup> Bei Isolaten invasiver Erkrankungen liegt die Resistenzrate unter 10 %.

<sup>=</sup> In mindestens einer Region liegt die Resistenzrate bei über 10 %.