

WICHTIG - PATIENTENPASS
Abacavir/Lamivudin ratiopharm® (Abacavir / Lamivudin) Tabletten
Tragen Sie diese Karte immer bei sich.

Da Abacavir/Lamivudin ratiopharm® Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin ratiopharm® einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich werden**, wenn Abacavir/Lamivudin ratiopharm® weiterhin eingenommen wird.

SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin ratiopharm® absetzen müssen, wenn:

- 1) **Sie einen Hautausschlag bekommen ODER**
- 2) **Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:**
 - Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin ratiopharm® aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin ratiopharm® oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel **EIN**, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin ratiopharm® entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt: Tel.:

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin ratiopharm® wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke oder Ihren Arzt.

Versionscode: Z06