


PARKINSON MEDIKATIONSHILFE

Mahlzeitenfreie Zeit Funktionstafel zur Nahrungsaufnahme

Zur Bestimmung der erforderlichen mahlzeitenfreien Zeit bei der Medikation mit Levodopa.



Name Ihres Medikamentes:

Dosierung: _____

Hier halten.

Uhrzeit der Einnahme:					
Menge:					

ratiopharm
Gute Preise. Gute Besserung.

Erstellt in Zusammenarbeit mit

Dr. med. Helmut Fischer, Internist - Pneumologe | Weilheim/ Obb.

Funktionsweise und Anwendung der Drehscheibe:

Entnehmen Sie der Tabelle auf der Vorderseite die Uhrzeit der ärztlich verordneten Medikamenteneinnahme. Stellen Sie diese Uhrzeit im Feld **Einnahmezeit** ein. Nutzen Sie hierfür das rechts angebrachte, orangene Rad.

Links neben dem Feld „Einnahmezeit“ können Sie nun ablesen, ab welcher Uhrzeit VOR der Einnahme des Medikamentes keine Nahrung mehr aufgenommen werden darf. Dem rechten Feld können Sie entnehmen, ab welcher Uhrzeit NACH der Medikamenteneinnahme wieder Nahrung aufgenommen werden darf.

Falls Sie sich mit der Medikamenteneinnahmezeit verspäten, stellen Sie die neue Einnahmezeit ein.

Wichtige Hinweise:

Ändern Sie Dosis und Einnahmezeit der Medikation nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Beim Auftreten von Beschwerden und Nebenwirkungen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt. Nahrungsaufnahme: Eine (1) Stunde VOR Einnahme und frühestens wieder 30 Min (0,5 Stunden) NACH Tabletteneinnahme möglich.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere medizinisch-wissenschaftliche Abteilung:



Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitags 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon: 0800 / 800 50 22
Fax: 0800 / 589 40 83
E-Mail: info@ratiopharm.de | info.teva-deutschland@teva.de Art. Nr.: XXX XXX Stand XX/2016